



Bollettino Agrometeorologico "Viticoltura"

Bollettini e schede del Manuale di Viticoltura del CVP su: www.CentroVitivinicoloProvinciale.it

BOLLETTINO STRAORDINARIO n° 20 del 02/08/2010

Straordinario: grandine Franciacorta

Venerdì sera si è verificato un evento grandinigeno che ha colpito parte della zona nord-est della Franciacorta. Si rilevano danni anche ingenti in zona tra Provaglio, Ome, Monticelli e Provezze, ma la grandinata si è estesa anche a parte del territorio di Passirano, Camignone, Cazzago.

Di fatto, con le tre grandinate del mese di Luglio, solo parte del territorio di Cortefranca è rimasto indenne.

→ FASE FENOLOGICA

Invaiaitura in corso o conclusa

→ OPERAZIONI SUI VIGNETI GRANDINATI

➤ *OPERAZIONI IN VERDE*

NON fare alcun intervento.

Non vale la pena cimare per stimolare il ricaccio, dato che siamo in fase di maturazione.

La maturazione ritarderà ulteriormente rispetto al previsto.

➤ *SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA*

Fare riferimento alla descrizione delle caratteristiche del Rame indicate sul precedente bollettino straordinario del 7 Luglio scorso.

➤ *PERONOSPORA*

Nei prossimi giorni **si dovranno mantenere sane le giovani foglie che si svilupperanno e che saranno particolarmente importanti per garantire la maturazione dell'uva laddove le grandinate hanno danneggiato le foglie adulte.**

MOMENTO DELL'INTERVENTO:

- Attendere l'emissione delle giovani foglie e, qualora si verifichino condizioni di rischio (piogge e bagnature), mantenere la protezione utilizzando dosi basse di **Rame** (200-250 g/ha di metallo), **da distribuirsi EVITANDO DI COLPIRE IL GRAPPOLO. RISPETTARE I TEMPI DI CARENZA!**

➤ *BOTRITE*

Dato il possibile permanere di condizioni di rischio (bagnature e/o umidità relative alte), si suggerisce di intervenire con un antibotritico solo purché si rispettino le seguenti indicazioni:

- Solo in zone umide o comunque non ventilate.
- **RISPETTARE I TEMPI DI CARENZA!**
- **Rispettare i limiti della misura 214:** Massimo due interventi all'anno. Tra i vari prodotti, Ciprodinil+Fludioxonil (Switch) e Fenexamide (Teldor) possono essere utilizzati due volte nella stagione, mentre gli altri antibotritici si possono utilizzare UNA volta ciascuno per un totale massimo di due volte. Teldor ha carenza minore di tutti.

→ **AZIENDE BIOLOGICHE: non vi sono interventi possibili (efficaci).**